

diosmectalGo®

Sospensione pronta da bere in bustine contenenti diosmectite

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo prodotto perché contiene importanti informazioni per lei.

Questo foglio è fatto per aiutarla ad utilizzare correttamente questo prodotto. Se ha qualsiasi ulteriore domanda, si rivolga al suo medico o al suo farmacista. Conservi questo foglio, potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.

Contenuto di questo foglio

1. Cos'è diosmectalGo® e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere diosmectalGo®
3. Come prendere diosmectalGo®
4. Possibili effetti indesiderati di diosmectalGo®
5. Come conservare diosmectalGo®
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è diosmectalGo® e a cosa serve

diosmectalGo® è una sospensione pronta da bere, in bustine monodose per somministrazione orale.

diosmectalGo® è indicato per:

- Il trattamento della diarrea acuta in **adulti e bambini di età superiore ad 8 anni**. Il trattamento della diarrea acuta nei bambini deve essere accompagnato dalla somministrazione di soluzioni reidratanti orali per evitare la disidratazione.
- Il trattamento della diarrea cronica o del dolore addominale negli **adulti**.

Il componente principale di diosmectalGo® è diosmectite. Diosmectite è un'argilla che aiuta a bloccare e a trattare la diarrea e ad alleviare il dolore addominale che:

- Si lega a tossine e germi (batteri e virus) ed aiuta ad eliminarli dal corpo
- Protegge il tratto intestinale ed aiuta a riparare il danno intestinale grazie alle sue proprietà di rivestimento.

2. Cosa deve sapere prima di prendere diosmectalGo®

Non prenda diosmectalGo®:

- Se è allergico alla diosmectite o ad uno qualsiasi degli altri componenti (vedere paragrafo 6 **Contenuto della confezione e altre informazioni**)
- Se è un bambino di età inferiore agli 8 anni con diarrea acuta
- Se è un bambino con diarrea cronica o dolore addominale.

Avvertenze speciali e precauzioni su questo prodotto

Non provi a trattare i sintomi da solo e consulti rapidamente un medico se:

- La diarrea è accompagnata da temperatura elevata, brividi o vomito ripetuto
- Ha segni di disidratazione (se lei si sente molto assetato, ha la lingua secca, è stanco e ha perdita di appetito persistente)
- Le sue feci contengono sangue o muco
- La diarrea è accompagnata da improvvisa perdita di peso
- La diarrea si verifica durante o dopo il trattamento con antibiotici
- Lei è a conoscenza di immunodeficienze o è attualmente sottoposto ad un trattamento che sopprime il suo sistema immunitario (trattamento immunosoppressivo o trattamento per il cancro)
- Lei è tornato recentemente da un viaggio in un Paese tropicale.

Non continui a trattare la sua diarrea e consulti il suo medico se:

- I suoi sintomi non migliorano o se peggiorano dopo la durata raccomandata del trattamento (vedere paragrafo 3 **Come prendere diosmectalGo®**)
- La diarrea ricompare frequentemente o è sottoposto ad attacchi alternati di diarrea e costipazione.

Prenda speciali precauzioni con diosmectalGo®

- diosmectalGo® deve essere usato con attenzione nei pazienti con storia di stipsi grave
- diosmectalGo® contiene una piccola quantità di etanolo (alcol), inferiore a 100 mg per dose giornaliera.

Avvertenze per pazienti con diarrea acuta

- Nei bambini diosmectalGo® **deve essere usato in associazione con una soluzione orale (ORS) per reintegrare i liquidi persi a causa della diarrea e per prevenire la disidratazione.**

L'assunzione di cibo nei bambini deve essere mantenuta anche se la diarrea persiste. Sono raccomandati frequenti e piccoli pasti di alimenti misti (es riso, uova, carne, alcuni frutti e verdure cotte).

Se il suo bambino mostra cambi nel comportamento, se i sintomi della diarrea non migliorano o peggiorano o se è presente vomito frequente e persistente, chiami il suo medico.

- Negli adulti con diarrea acuta, diosmectalGo® è un trattamento supplementare alla reidratazione con acqua, per reintegrare i liquidi persi a causa della diarrea. L'assunzione di cibo deve essere mantenuta anche se la diarrea persiste. Sono raccomandati pasti piccoli e leggeri, con esclusione di pasti grassi, pesanti, speziati, stimolanti o succhi di frutta.

Il trattamento della diarrea nei pazienti anziani e fragili richiede particolare attenzione, la diarrea può causare significativa perdita di liquidi (disidratazione) che può avere serie conseguenze.

Avvertenze per pazienti con diarrea cronica o dolore addominale

Non è raccomandato l'uso prolungato e ripetuto di diosmectalGo®. In caso di diarrea cronica o dolore addominale, se i sintomi persistono per più di due settimane consulti il suo medico, in modo che le cause sottostanti possano essere studiate prima di continuare il trattamento.

Altri medicinali e diosmectalGo®

Non prenda diosmectalGo® contemporaneamente ad altri medicinali orali per evitare la riduzione dell'efficacia di questi ultimi. È raccomandato un intervallo di 2 ore tra l'assunzione di diosmectalGo® ed altri medicinali. Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale o dispositivo medico, inclusi quelli senza prescrizione.

Gravidanza e allattamento

L'utilizzo di diosmectalGo® non è raccomandato durante la gravidanza e l'allattamento.

Se è in corso una gravidanza o se sta allattando con latte materno, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere diosmectalGo®.

3. Come prendere diosmectalGo®

Modo di somministrazione:

Questo prodotto va assunto per via orale ed è pronto da bere. Il contenuto della bustina può essere ingerito direttamente.

Massaggi la bustina prima di aprirla.

Ogni bustina deve essere utilizzata una volta sola dopo averla aperta.

Dosaggio raccomandato

• Diarrea acuta

Età	Dose
Bambini (dagli 8 ai 15 anni inclusi)	2 bustine per iniziare, seguite da 1 bustina ogni evacuazione molle, fino a 4 bustine al giorno. Una soluzione reidratante orale (ORS) deve essere presa per reintegrare liquidi persi a causa della diarrea e per prevenire la disidratazione.
Adulti e bambini sopra i 15 anni	2 bustine per iniziare, seguite da 1 bustina ogni evacuazione molle, fino a 6 bustine al giorno.

Per quanto tempo prendere diosmectalGo® per la diarrea acuta:

Lei può usare diosmectalGo® **per un massimo di 3 giorni**. Se la diarrea dura più di 3 giorni, consulti il suo medico.

• Diarrea cronica e dolore addominale

Età	Dose
Esclusivamente adulti	Fino a 3 bustine al giorno (1 di mattina, 1 a metà giornata, 1 di sera), come richiesto.

Per quanto tempo prendere diosmectalGo® per la diarrea cronica o il dolore addominale:

Senza consiglio medico può utilizzare questo prodotto **per un massimo di 2 settimane**. Usi prolungati o ripetuti di diosmectalGo® non sono raccomandati.

Se ha dimenticato di prendere diosmectalGo®

Se ha dimenticato di prendere una dose, prenda la dose dopo la successiva evacuazione molle (movimento intestinale). Non superare la dose giornaliera raccomandata.

4. Possibili effetti indesiderati

Il più comune effetto indesiderato riportato durante il trattamento è la **costipazione**. Se si verifica costipazione, il trattamento deve essere interrotto e se necessario ripreso a dose giornaliera più bassa. Altri effetti indesiderati meno comuni riportati includono eruzioni cutanee, orticaria, prurito ed angioedema (pelle, labbra, gola e lingua gonfie).

Se lei nota un qualsiasi altro effetto indesiderato non elencato in questo foglio, o se qualsiasi effetto indesiderato persiste, consulti il suo medico o il farmacista. Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato grave, può segnalarlo al fabbricante IPSEN Consumer HealthCare e/o ad un operatore sanitario.

5. Come conservare diosmectalGo®

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

diosmectalGo® non deve essere usato dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione. Non c'è alcuna condizione particolare di conservazione per questo dispositivo medico.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Il componente principale di diosmectalGo® è diosmectite 3g per bustina.

Altri componenti sono: Gusto di Caramello Cacao*, Gomma di Xantano, Acido Citrico Monoidrato, Acido Ascorbico, Sorbato di Potassio, Sucralosio, Acqua Purificata.

*Composizione del gusto di Caramello Cacao: miscela di aromi naturali e sintetici, colorante caramello E150d, sciroppo di zucchero caramellato, glicole propilenico E1520, acqua, etanolo, caffeina.



Fabbricante:



IPSEN Consumer HealthCare
65 quai Georges Gorse
92100 Boulogne-Billancourt
Francia
Telefono: +33 (0)1 58 33 00 00

Ultima revisione: **Febbraio 2019**